

Código	Nombre	Definición	Código	Nombre	Definición
1	Desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades	Aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.	15	Riesgo de estreñimiento	Riesgo de sufrir una disminución de la frecuencia normal de defecación acompañado de eliminación difícil o incompleta de las heces o eliminación de heces duras y secas.
2	Desequilibrio nutricional: ingesta inferior a las necesidades	Ingesta de nutrientes insuficiente para satisfacer las necesidades metabólicas.	16	Deterioro de la eliminación urinaria	Disfunción de la eliminación urinaria.
3	Riesgo de desequilibrio nutricional: ingesta superior a las necesidades	Riesgo de aporte de nutrientes que excede las necesidades metabólicas.	17	Incontinencia urinaria de esfuerzo	Pérdida súbita de orina al realizar actividades que aumentan la presión intraabdominal.
4	Riesgo de infección	Aumento del riesgo de ser invadido por organismos patógenos.	18	Incontinencia urinaria refleja	Pérdida involuntaria de orina a intervalos previsibles cuando se alcanza un volumen vesical específico.
5	Riesgo de desequilibrio de la temperatura corporal	Riesgo de fallo en el mantenimiento de la temperatura corporal dentro de los límites normales.	19	Incontinencia urinaria de urgencia	Emisión involuntaria de orina poco después de sentir una intensa sensación de urgencia de orinar.
6	Hipotermia	Temperatura corporal por debajo del rango normal.	20	Incontinencia urinaria funcional	Incapacidad de una persona, normalmente continente, para llegar al inodoro a tiempo de evitar la pérdida involuntaria de orina.
7	Hipertermia	Elevación de la temperatura corporal por encima de lo normal.	21		
8	Termorregulación ineficaz	Fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia.	22	Riesgo de incontinencia urinaria de urgencia	Riesgo de sufrir una emisión involuntaria de orina asociada a una sensación súbita e intensa de urgencia de orinar. Vaciado incompleto de la vejiga.
9	Disreflexia autónoma	Respuesta no inhibida, amenazadora para la vida, del sistema nervioso simpático ante un estímulo nocivo tras una lesión medular a nivel D7 o superior.	23	Retención urinaria	
10	Riesgo de disreflexia autónoma	Riesgo de respuesta no inhibida, amenazadora para la vida, del sistema simpático tras un shock medular, en una persona con una alteración o lesión en la médula espinal a nivel D6 o superior (se ha demostrado en pacientes con lesiones en D7 y D8)	24	Perfusión tisular inefectiva (especificar el	Reducción del aporte de oxígeno que provoca la incapacidad para nutrir los tejidos a nivel capilar. Riesgo de sufrir una disminución, aumento o cambio rápido
11	Estreñimiento	Reducción de la frecuencia normal de evacuación intestinal, acompañada de eliminación dificultosa o incompleta de heces excesivamente duras y secas.		tipo: renal, cerebral, cardiopulmonar, gastrointestinal, periférica)	
12	Estreñimiento subjetivo	Autodiagnóstico de estreñimiento y abuso de laxantes, enemas y supositorios para asegurar una evacuación intestinal diaria.	25-26	Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos Exceso de volumen de líquidos	
13	Diarrea	Eliminación de heces líquidas, no formadas.	27	Déficit de volumen de líquidos	Disminución del líquido intravascular, intersticial o
14	Incontinencia fecal	Cambio en el hábito de eliminación fecal normal caracterizado por la emisión involuntaria de heces.			intracelular. Se refiere a la deshidratación o pérdida sólo de agua, sin cambio en el nivel de Na (sodio).

28	Riesgo de déficit de volumen de líquidos	Riesgo de sufrir una deshidratación vascular, celular o intracelular.
29	Disminución del gasto cardíaco	La cantidad de sangre bombeada por el corazón es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del cuerpo.
30	Deterioro del intercambio de gases	Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación de dióxido de carbono en la membrana alveolocapilar.
31	Limpieza ineficaz de las vías aéreas	Incapacidad para eliminar las secreciones u obstrucciones del tracto respiratorio para mantener las vías aéreas permeables.
32	Patrón respiratorio ineficaz	La inspiración o espiración no proporciona una ventilación adecuada.
33	Deterioro de la ventilación espontánea	Disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad de la persona para sostener la respiración adecuada para el mantenimiento de la vida.
34	Respuesta ventilatoria disfuncional al destete	Incapacidad para adaptarse a la reducción de los niveles del soporte ventilatorio mecánico, lo que interrumpe y prolonga el período de destete.
35	Riesgo de lesión	Riesgo de lesión como consecuencia de la interacción de condiciones ambientales con los recursos adaptativos y defensivos de la persona.
36	Riesgo de asfixia	Aumento del riesgo de asfixia accidental (aire disponible para la inhalación inadecuado).
37	Riesgo de intoxicación	Aumento del riesgo de exposición o ingestión accidental de sustancias o productos peligrosos en dosis suficiente para originar una intoxicación.
38	Riesgo de traumatismo	Aumento del riesgo de lesión tisular accidental (p. Ej., una herida, una quemadura, una fractura).
39	Riesgo de aspiración	Riesgo de que penetren en el árbol traqueobronquial las secreciones gastrointestinales, orofaríngeas, o sólidos o líquidos.
40	Riesgo de síndrome de desuso	Riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de la inactividad musculoesquelética prescrita o inevitable.
41	Respuesta alérgica al látex	Reacción de hipersensibilidad a los productos de goma de látex natural.
42	Riesgo de respuesta alérgica al látex	Riesgo de hipersensibilidad a los productos de goma de látex natural.
43	Protección ineficaz	Disminución de la capacidad para autoprotegerse de amenazas internas y externas, como enfermedades o lesiones.
44	Deterioro de la integridad tisular	Lesión de la membrana mucosa, corneal, integumentaria o de los tejidos subcutáneos.
45	Deterioro de la mucosa oral	Alteración de los labios y/o tejidos blandos de la cavidad oral.

46	Deterioro de la integridad cutánea	Alteración de la epidermis y/o dermis.
47	Riesgo de deterioro de la integridad cutánea	Riesgo de alteración cutánea adversa.
48	Deterioro de la dentición	Alteración de los patrones de erupción o desarrollo de los dientes o de la integridad estructural de la dentadura.
49	Disminución de la capacidad adaptativa intracraneal	Compromiso de los mecanismos de la dinámica de líquido intracraneal que normalmente compensan el incremento del volumen intracraneal, resultando en repetidos aumentos desproporcionados de la
50	Perturbación del campo de energía	Desorganización del flujo de energía que rodea a una persona, lo que ocasiona una falta de armonía del cuerpo, la mente o y/o el espíritu.
51	Deterioro de la comunicación verbal	Disminución, retraso o carencia de la capacidad para recibir, procesar, transmitir y usar un sistema de símbolos.
52	Deterioro de la interacción social	Cantidad insuficiente o excesiva o cualitativamente ineficaz de intercambio social.
53	Aislamiento social	Soledad experimentada por el individuo y percibida como negativa o amenazadora e impuesta por otros.
54	Riesgo de soledad	Riesgo de experimentar malestar asociado al deseo o necesidad de aumentar el contacto con los demás.
55	Desempeño ineficaz del rol	Patrones de conducta y expresión propia que no concuerdan con las expectativas, normas y contexto en que se encuentra.
56	Deterioro parental	Incapacidad del cuidador principal para crear, mantener o recuperar un entorno que promueva el óptimo crecimiento y desarrollo del niño.
57	Riesgo de deterioro parental	El cuidador principal corre el riesgo de no poder crear, mantener o recuperar un entorno que promueva el crecimiento y desarrollo óptimos del niño.
58	Riesgo de deterioro de la vinculación	Alteración del proceso interactivo entre los padres o persona significativa y el lactante/niño que fomenta el desarrollo de una relación recíproca protectora y formativa.
59	Disfunción sexual	Estado en que la persona experimenta un cambio en la función sexual durante las fases de respuesta sexual de deseo, excitación y orgasmo que se contempla como insatisfactorio, inadecuado o no gratificante.
60	Interrupción de los procesos familiares	Cambio en las relaciones o en el funcionamiento familiar.
61	Cansancio del rol de cuidador	Dificultad para el rol de cuidador de la familia.
62	Riesgo de cansancio del rol de cuidador	El cuidador es vulnerable por percibir dificultad en el desempeño del rol de cuidador familiar.
63	Procesos familiares disfuncionales	Las funciones psicosociales, espirituales y fisiológicas de la unidad familiar están crónicamente desorganizadas, lo que conduce a conflictos, negación de los problemas, resistencia al cambio, solución inefectiva de los problemas y una serie de crisis que se perpetúan por sí mismas.

64	Conflicto del rol parental	Uno de los progenitores experimenta confusión y conflicto del rol en respuesta a una crisis.
65	Patrón sexual ineficaz	Expresión de preocupación respecto a la propia sexualidad.
66	Sufrimiento espiritual	Deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza, o un poder superior al propio yo.
67	Riesgo de sufrimiento espiritual	Riesgo de deterioro de la capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión de la persona con el yo, otras personas, el arte, la música, la literatura, la naturaleza y/o un poder superior a uno mismo.
68	Disposición para mejorar el bienestar espiritual	Capacidad para experimentar e integrar el significado y propósito de la vida mediante la conexión con el yo, los otros, el arte, la música, la literatura, la naturaleza o un poder superior al propio yo que puede ser reforzada.
69	Afrontamiento ineficaz	Incapacidad para formular una apreciación válida de los agentes estresantes, elecciones inadecuadas de respuestas practicadas y/o incapacidad para utilizar los recursos disponibles.
70	Deterioro de la adaptación	Incapacidad para modificar el estilo de vida de forma coherente con un cambio en la situación de salud.
71	Afrontamiento defensivo	Proyección repetida de una autoevaluación falsamente positiva basada en un patrón protector que defiende a la persona de lo que percibe como amenazas subyacentes a su autoimagen positiva.
72	Negación ineficaz	Intento consciente o inconsciente de pasar por alto el conocimiento o significado de un acontecimiento, para reducir la ansiedad o el temor, que conduce a un detrimento de la salud.
73	Afrontamiento familiar incapacitante	Comportamiento de una persona significativa (familiar u otra persona de referencia) que inhabilita sus propias capacidades y las del cliente para abordar de forma eficaz las tareas esenciales para la adaptación de ambos al reto de salud.
74	Afrontamiento familiar comprometido	La persona principal (un familiar o un amigo íntimo) que habitualmente brinda soporte proporciona un apoyo, confort, ayuda o estímulo que puede ser necesario para que el cliente maneje o domine las tareas adaptativas relacionadas con su reto de salud, que es insuficiente, ineficaz o está comprometido.
75	Disposición para mejorar el afrontamiento familiar	Manejo efectivo de las tareas adaptativas del miembro de la familia implicado en el reto de salud del cliente, que ahora muestra deseos y disponibilidad para mejorar su propia salud y desarrollo y los del cliente.

76	Disposición para mejorar el afrontamiento de la comunidad	Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y solución de problemas que resulta adecuado para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad, pero que puede mejorarse para el manejo de problemas o agentes estresantes actuales o futuros.
77	Afrontamiento ineficaz de la comunidad	Patrón de actividades de la comunidad para la adaptación y solución de problemas que resulta inadecuado para satisfacer las demandas o necesidades de la comunidad.
78	Gestión ineficaz de la propia salud	Patrón de regulación e integración en la vida cotidiana de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud.
79	Incumplimiento	Conducta de una persona o un cuidador que no coincide con el plan terapéutico o de promoción de la salud acordado entre la persona (o la familia o la comunidad) y un profesional de la salud. Ante un plan terapéutico o de promoción de la salud acordado, la conducta de la persona o del cuidador lo incumple total o parcialmente y puede conducir a resultados clínicos parcial o totalmente ineficaces.
80	Gestión ineficaz del régimen terapéutico familiar	Patrón de regulación e integración en los procesos familiares de un programa para el tratamiento de la enfermedad y de sus secuelas que resulta insatisfactorio para alcanzar objetivos específicos de salud.
83	Conflicto de decisiones	Incertidumbre sobre el curso de la acción a tomar cuando la elección entre acciones diversas implica riesgo, pérdida o supone un reto para los valores y creencias personales.
84	Conductas generadoras de salud (especificar)	Búsqueda activa (en una persona con una salud estable) de formas de modificar los hábitos sanitarios personales o el entorno para alcanzar un nivel más alto de salud.
85	Deterioro de la movilidad física	Limitación del movimiento físico independiente, intencionado del cuerpo o de una o más extremidades.
86	Riesgo de disfunción neurovascular periférica	Riesgo de sufrir una alteración en la circulación, sensibilidad o movilidad de una extremidad.
87	Riesgo de lesión postural perioperatoria	Riesgo de cambios anatómicos y físicos accidentales como consecuencia de la postura o equipo usado durante un procedimiento quirúrgico/invasivo.

88	Deterioro de la ambulación	Limitación del movimiento independiente a pie en el entorno.
89	Deterioro de la movilidad en silla de ruedas	Limitación de la manipulación independiente de la silla de ruedas en el entorno.
90	Deterioro de la habilidad para la traslación	Limitación del movimiento independiente entre dos superficies cercanas.
91	Deterioro de la movilidad en la cama	Limitación del movimiento independiente para cambiar de postura en la cama.
92	Intolerancia a la actividad	Insuficiente energía fisiológica o psicológica para tolerar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.
93	Fatiga	Sensación sostenida y abrumadora de agotamiento y disminución de la capacidad para el trabajo mental y físico al nivel habitual.
94	Riesgo de intolerancia a la actividad	Riesgo de experimentar una falta de energía fisiológica o psicológica para iniciar o completar las actividades diarias requeridas o deseadas.
95	Insomnio	Trastorno de la cantidad y calidad del sueño que deteriora el funcionamiento.
96	Deprivación de sueño	Períodos de tiempo prolongados sin sueño (suspensión periódica, naturalmente sostenida, de relativa inconsciencia).
97	Déficit de actividades recreativas	Disminución de la estimulación (o interés o participación) en actividades recreativas o de ocio.
98	Deterioro en el mantenimiento del hogar	Incapacidad para mantener independientemente un entorno inmediato seguro que promueva el crecimiento.
99	Mantenimiento ineficaz de la salud	Incapacidad para identificar, manejar o buscar ayuda para mantener la salud.
100	Retraso en la recuperación quirúrgica	Aumento del número de días del postoperatorio requeridos por una persona para iniciar y realizar actividades para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar.
101	Deterioro generalizado del adulto	Deterioro funcional progresivo de naturaleza física y cognitiva. Notable disminución de la capacidad de la persona para vivir con una enfermedad multisistémica, afrontar los problemas subsiguientes y manejar sus propios cuidados.
102	Déficit de autocuidado: alimentación	Deterioro de la habilidad para realizar o completar las actividades de autoalimentación.
103	Deterioro de la deglución	Funcionamiento anormal del mecanismo de la deglución asociado con déficit de la estructura o función oral, faríngea o esofágica.

104	Lactancia materna ineficaz	La madre, el lactante o el niño experimentan insatisfacción o dificultad con el proceso de lactancia materna.
105	Interrupción de la lactancia materna	Interrupción en la continuidad del proceso de lactancia materna debido a la incapacidad o inconveniencia de poner al niño al pecho de la madre.
106	Lactancia materna eficaz	La familia o la díada madre-lactante demuestran una habilidad adecuada y satisfacción con el proceso de lactancia materna.
107	Patrón de alimentación ineficaz del lactante	Deterioro de la habilidad del lactante para succionar o coordinar la respuesta de succión y deglución, lo que comporta una nutrición oral inadecuada para las necesidades metabólicas.
108	Déficit de autocuidado: baño	Deterioro de la habilidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de baño / higiene.
109	Déficit de autocuidado: vestido	Deterioro de la capacidad de la persona para realizar o completar por sí misma las actividades de vestido y arreglo personal.
110	Déficit de autocuidado: uso del inodoro	Deterioro de la habilidad para realizar o completar por sí misma las actividades de evacuación.
111	Retraso en el crecimiento y desarrollo	Desviaciones de las normas para el grupo de edad.
112	Riesgo de retraso en el desarrollo	Riesgo de sufrir un retraso del 25% o más en una o más áreas de conducta social o autorreguladora, cognitiva, del lenguaje o de las habilidades motoras groseras o finas.
113	Riesgo de crecimiento desproporcionado	Riesgo de crecimiento por encima del percentil 97 o por debajo del percentil 3 para la edad, cruzando dos canales de percentiles.
114	Síndrome de estrés del traslado	Trastorno fisiológico o psicológico tras el traslado de un entorno a otro.
115	Riesgo de conducta desorganizada del lactante	Riesgo de sufrir una alteración en la integración y modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual del lactante (es decir, sistemas autónomo, motor, organizativo, autorregulador y de atención-interacción).
116	Conducta desorganizada del lactante	Desintegración de las respuestas fisiológicas y neurocomportamentales del lactante respecto al entorno.
117	Disposición para mejorar la organización de la conducta del lactante	El patrón de modulación de los sistemas de funcionamiento fisiológico y conductual de un lactante (es decir, los sistemas autonómico, motor, organizativo, autorregulador y de atención-interacción) es satisfactorio pero puede mejorarse.
118	Trastorno de la imagen corporal	Confusión en la imagen mental del yo físico.
119	Baja autoestima crónica	Larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia uno mismo o sus propias capacidades.

120	Baja autoestima situacional	Desarrollo de una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual (especificar).	129	Confusión crónica	Deterioro irreversible, de larga duración o progresivo del intelecto y de la personalidad, caracterizado por disminución de la capacidad para interpretar los estímulos ambientales: reducción de la capacidad para los procesos de pensamiento intelectuales, manifestado por trastornos de la memoria, de la orientación y de la conducta.
121	Trastorno de la identidad personal	Incapacidad para mantener una percepción completa e integrada del yo.			
122	Trastorno de la percepción sensorial (especificar: visual, auditiva, cinestésica, gustativa, táctil, olfatoria)	Cambio en la cantidad o en el patrón de los estímulos que percibe acompañado por una respuesta disminuida, exagerada, distorsionada o deteriorada a los mismos.	131	Deterioro de la memoria	Incapacidad para recordar o recuperar parcelas de información o habilidades conductuales
123	Desatención unilateral	Deterioro de la respuesta sensorial y motora, la representación mental y la atención espacial del cuerpo y el entorno correspondiente, caracterizado por la falta de atención a un lado y una atención excesiva al lado opuesto. La desatención del lado izquierdo es más persistente y severa que la desatención del lado derecho.	132	Dolor agudo	Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o previsible y una duración inferior a 6 meses.
124	Desesperanza	Estado subjetivo en el que la persona percibe pocas o ninguna alternativa o elecciones personales y es incapaz de movilizar su energía en su propio provecho.	133	Dolor crónico	Experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular real o potencial o descrita en tales términos (International Association for the Study of Pain); inicio súbito o lento de cualquier intensidad de leve a grave, constante o recurrente sin un final anticipado o previsible y una duración superior a 6
125	Impotencia	Percepción de que las propias acciones no variarán significativamente el resultado; percepción de falta de control sobre la situación actual o un acontecimiento inmediato.	134	Náuseas	Sensación subjetiva desagradable, como oleadas, en la parte posterior de la garganta, en el epigastrio o en el abdomen que puede provocar la urgencia o necesidad de vomitar.
126	Conocimientos deficientes	Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico.	135	Duelo complicado	Trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las expectativas habituales y se manifiesta en un deterioro funcional.
127	Síndrome de deterioro en la interpretación del entorno	Falta constante de orientación respecto a las personas, el espacio, el tiempo o las circunstancias, durante más de 3 a 6 meses que requiere un entorno protector.	136	Duelo	Complejo proceso normal que incluye respuestas y conductas emocionales, físicas, espirituales, sociales e intelectuales mediante las que las personas, familias y comunidades incorporan en su vida diaria una pérdida real, anticipada o percibida.
128	Confusión aguda	Inicio brusco de trastornos reversibles de la conciencia, atención, conocimiento y percepción que se desarrollan en un corto período de tiempo.	137	Aflicción crónica	Patrón cíclico, recurrente y potencialmente progresivo de tristeza omnipresente experimentado (por un familiar, cuidador, individuo con una enfermedad crónica o discapacidad) en respuesta a una pérdida continua, en el curso de una enfermedad o discapad.

138	Riesgo de violencia dirigida a otros	Riesgo de conductas en que la persona demuestre que puede ser física, emocional o sexualmente lesiva para otros.
139	Riesgo de automutilación	Riesgo de conducta deliberadamente autolesiva que causa un daño tisular con la intención de provocar una lesión no letal que alivie la tensión.
142	Síndrome traumático de la violación	Persistencia de una respuesta desadaptada a una penetración sexual forzada, violenta, contra la voluntad de la víctima y sin su consentimiento.
145	Riesgo de síndrome postraumático	Riesgo de presentar una respuesta desadaptada sostenida a un acontecimiento traumático o abrumador.
146	Ansiedad	Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica (el origen de la cual con frecuencia es inespecífico o desconocido para el individuo); sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un peligro. Es una señal se alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas para afrontar la amenaza.
147	Ansiedad ante la muerte	Sensación vaga e iraquilizante de maestar o temor provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada a la propia existencia.
148	Temor	Respuesta a la percepción de una amenaza que se reconoce conscientemente como un peligro.
149	Riesgo de síndrome de estrés del traslado	Riesgo de sufrir un trastorno fisiológico o psicológico después del traslado de un entorno a otro.
150	Riesgo de suicidio	Riesgo de lesión autoinfligida que pone en peligro la vida.
151	Automutilación	Conducta deliberadamente autolesiva que causa un daño tisular con la intención de provocar una lesión no letal que alivie la tensión.

152	Riesgo de impotencia	Riesgo de percibir una falta de control sobre la situación o sobre la propia capacidad para influir en el resultado de forma significativa.
153	Riesgo de baja autoestima situacional	Riesgo de desarrollar una percepción negativa de la propia valía en respuesta a una situación actual (especificar)
154	Vagabundo	Caminar errabundo, repetitivo o sin propósito definido que hace a la persona susceptible de sufrir lesiones; frecuentemente es incongruente con las fronteras, los límites a los obstáculos.
155	Riesgo de caídas	Aumento de la susceptibilidad a las caídas que pueden causar daño físico.
156	Riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante	Presencia de factores de riesgo para la muerte súbita de un niño de edad inferior a 1 año.
157	Disposición para mejorar la comunicación	Patrón de intercambio de información e ideas con otros que es suficiente para satisfacer las necesidades y objetivos vitales de la persona y que puede ser reforzado.
158	Disposición para mejorar el afrontamiento	Patrón de esfuerzos cognitivos y conductuales para manejar las demandas que resulta suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.
159	Disposición para mejorar los procesos familiares	Patrón de funcionamiento familiar que es suficiente para apoyar el bienestar de los miembros de la familia y que puede ser reforzado.
160	Disposición para mejorar el equilibrio de líquidos	Patrón de equilibrio entre el volumen de líquidos y la composición química de los líquidos corporales que es suficiente para satisfacer las necesidades físicas y puede ser reforzado.
161	Disposición para mejorar los conocimientos	La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada.
162	Disposición para mejorar la gestión de la propia salud	Patrón de regulación e integración en la vida diaria de un régimen terapéutico para el tratamiento de la enfermedad y sus secuelas que es suficiente para alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
163	Disposición para mejorar la nutrición	Patrón de aporte de nutrientes que resulta suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas y que puede ser reforzado.

164	Disposición para mejorar el rol parental	Patrón de provisión de un entorno para los niños u otras personas dependientes que es suficiente para favorecer el crecimiento y desarrollo y que puede ser reforzado.	176	Incontinencia urinaria por rebosamiento	Pérdida involuntaria de orina asociada a una sobredistensión de la vejiga.
165	Disposición para mejorar el sueño	Patrón de suspensión natural y periódica de la conciencia que proporciona el reposo adecuado, permite el estilo de vida deseado y puede ser reforzado.	177	Estrés por sobrecarga	Excesiva cantidad y tipo de demandas que requieren acción.
166	Disposición para mejorar la eliminación urinaria	Patrón de la función urinaria que es suficiente para satisfacer las necesidades de eliminación y puede ser reforzado.	178	Riesgo de deterioro de la función hepática	Riesgo de disminución de la función hepática que puede comprometer la salud.
167	Disposición para mejorar el autoconcepto	Patrón de percepciones o ideas sobre uno mismo que es suficiente para el bienestar y que puede ser reforzado.	179	Riesgo de nivel de glucemia inestable	Riesgo de variación de los límites normales de los niveles de glucosa /azúcar en sangre.
168	Sedentarismo	Informe sobre hábitos de vida que se caracterizan por un bajo nivel de actividad física.	180	Riesgo de contaminación	Acentuación del riesgo de exposición a contaminantes ambientales en dosis suficientes para causar efectos adversos para la salud.
169	Deterioro de la religiosidad	Deterioro de la capacidad para confiar en las creencias religiosas o participar en los rituales de una tradición religiosa en particular.	181	Contaminación	Exposición a contaminantes ambientales en dosis suficientes para causar efectos adversos para la salud.
170	Riesgo de deterioro de la religiosidad	Riesgo de deterioro de la capacidad para confiar en las creencias religiosas y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.	182	Disposición para mejorar el autocuidado	Patrón de realización de actividades por parte de la propia persona que le ayuda a alcanzar los objetivos relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
171	Disposición para mejorar la religiosidad	Capacidad para aumentar la confianza en las creencias religiosas y/o participar en los ritos de una tradición religiosa en particular.	183	Disposición para mejorar el confort	Patrón de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental y social que puede ser reforzado.
172	Riesgo de duelo complicado	Riesgo de aparición de un trastorno que ocurre tras la muerte de una persona significativa, en el que la experiencia del sufrimiento que acompaña al luto no sigue las expectativas normales y se manifiesta en un deterioro funcional.	184	Disposición para mejorar la toma de decisiones	Patrón de elección del rumbo de las acciones que es suficiente para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo relacionados con la salud y que puede ser reforzado.
173	Riesgo de confusión aguda	Riesgo de aparición de trastornos reversibles de la conciencia, atención, conocimiento y percepción que se desarrollan en un corto período de tiempo.	185	Disposición para mejorar la esperanza	Patrón de expectativas y deseos que es suficiente para movilizar energía en beneficio propio y que puede ser reforzado.
174	Riesgo de compromiso de la dignidad humana	Riesgo de percepción de pérdida del respeto y del honor.	186	Disposición para mejorar el estado de inmunización	Patrón de seguimiento de los estándares de inmunización locales, nacionales e internacionales para prevenir las enfermedades infecciosas que es suficiente para proteger a la persona, familia o comunidad y que puede ser reforzado.
175	Sufrimiento moral	Respuesta a la incapacidad para llevar a cabo las decisiones/acciones éticas/morales elegidas.	187	Disposición para mejorar el poder	Patrón de participación informada (basada en el conocimiento) en el cambio que es suficiente para alcanzar el bienestar y que puede ser reforzado.

188	Tendencia a adoptar conductas de riesgo para la salud	Deteroro de la capacidad para modificar el estilo de vida o las conductas de forma que mejore el estado de salud.
193	Descuido personal	Constelación de conductas culturalmente enmarcadas que amplian una o más actividades de autocuidado en las que hay un fracaso para mantener estabndares de salud y
194	Ictericia neonatal	Coloración amarillo-anaranjada de la piel y membranas mucosas del neonato que aparece a las 24 horas de vida como resultado de la presencia de bilirrubina no conjugada
195	Riesgo de desequilibrio electrolítico	Riesgo de cambio en el nivel de electrolitos séricos que puede comprometer la salud.
196	Motilidad gastrointestinal disfuncional	Aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema gastrointestinal.
197	Riesgo de motilidad gastrointestinal disfun	Riesgo de aumento, disminución, ineficacia o falta de actividad peristáltica en el sistema gastrointestinal.
198	Trastorno del patrón del sueño	Interrupciones durante un tiempo limitado de la cantidad y calidad del sueño debida a factores externos.
199	Planificación ineficaz de las actividades	Incapacidad para prepararse para un conjunto de acciones fijadas en el tiempo y bajo ciertas condiciones.
200	Riesgo de disminución de la perfusión tisú	Riesgo de disminución de la circulación cardíaca (coronaria).
201	Riesgo de perfusión tisular cerebral inefica	Riesgo de disminución de la circulación tisular cerebral.
202	Riesgo de perfusión gastrointestinal inefic	Riesgo de disminucón de la circulación gastrointestinal
203	Riesgo de perfusión renal ineficaz	Riesgo de disminución de la circulación sanguínea renal que puede comprometer la salud.
204	Perfusión tisula periférica ineficaz	Disminución de la circulación sanguínea periférica que puede comprometer la salud.
205	Riesgo de shock	Riesgo de aporte sanguíneo inadecuado a los tejidos corporales que puede conducir a una disfunción celular que constituye una amenaza para la vida.

206	Riesgo de sangrado	Riesgo de disminución del volumen de sangre que puede comprometer la salud.
207	Disposición para mejorar las relaciones	Patrón de colaboración que es suficiente para satisfacer las necesidades mutuas y que puede ser reforzado.
208	Disposición para mejorar el proceso de m	Patrón de preparación, mantenimiento y refuerzo de un embarazo, alumbramiento y cuidado del recién nacido saludable.
209	Riesgo de alteración de la díada materno/	Riesgo de alteración de la díada simbiótica materno_fetal como resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo.
210	Deterioro de la capacidad de recuperación	Reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuestas positivas ante una situación aderversa o una crisis.
211	Riesgo de compromiso de la capacidad de	Riesgo de reducción de la capacidad para mantener un patrón de respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis.
212	Disposición para mejorar la capacidad de	Patrón de respuestas positivas ante una situación adversa o una crisis que puede reforzarse para optimizar el potencial humano.
213	Riesgo de traumatismo vascular	Riesgo de lesión en una vena y tejidos circundantes relacionado con la presencia de un catéter y/o con la perfusión de soluciones.
214	Disconfort	Percepción de falta de tranquilidad, alivio y trascendencia en las dimensiones física, psicoespiritual, ambiental y social.

